

AKTUELLES DRUG CHECKING ERGEBNIS AUS INNSBRUCK

Hochdosierte, verunreinigte XTC-Tablette

Jänner 2024

Als XTC zur Analyse gebracht:

Tatsächliche Inhaltsstoffe

**MDMA 147 mg/Tablette,
unbekannte psychoaktive
Substanz**

Gesamtgewicht: 351,6 mg

Logo: Blue Punisher

Rückseite: Bruchrille

Farbe: blau

**MDMA 123 mg/Tablette,
unbekannte psychoaktive
Substanz**

Gesamtgewicht: 377,1 mg

Logo: Blue Punisher

Rückseite: Bruchrille

Farbe: blau

**MDMA 178 mg/Tablette,
unbekannte psychoaktive
Substanz**

Gesamtgewicht: 358,1 mg

Logo: Blue Punisher

Rückseite: Bruchrille

Farbe: blau



In Innsbruck wurden mehrere hochdosierte und mit einer unbekanntem psychoaktiven Substanz verunreinigte XTC-Pillen analysiert. Wir raten vom Konsum ab!

Solltest du dich doch für einen Konsum entscheiden:

Um Überdosierungen zu vermeiden, soll eine max. Dosierung von 1.5 mg pro kg Körpergewicht für Männer und max. 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen nicht überschritten werden! (Bsp.: Mann mit 80 kg Körpergewicht; Maximaldosierung 120 mg MDMA). Nebenwirkungen wie „Kiefer mahlen“, Augen- und Nervenzucken, bis hin zu Krampfanfällen können bei hohen MDMA Dosen häufiger auftreten. Bei Überdosierungen steigt die Körpertemperatur stärker an und es kann zu unangenehmen Halluzinationen kommen. An Folgetagen, nach der Einnahme hoher Dosen MDMA, treten vermehrt Depressionen, Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen und Appetitlosigkeit auf. Bei einer regelmäßigen hoch dosierten Einnahme von MDMA ist die Wahrscheinlichkeit, dass irreparable Hirnschäden entstehen, größer.

MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühle sind reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Die möglichen angenehm erlebten Wirkungen werden häufig beschrieben mit Euphorie, Glücksgefühlen, emotionaler Nähe, Gefühl der Zusammengehörigkeit, gesteigertem Kontaktbedürfnis oder dem Abbau von Hemmungen. Seh- und Hörvermögen können sich verändern, Berührungen und Musik intensiver wahrgenommen werden.

Nebenwirkungen: Kiefern mahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht auch die Gefahr eines Hitzschlags, da die Körpertemperatur erhöht wird. Außerdem kann es zu Orientierungsschwierigkeiten, Schreckensvisionen und Ängstlichkeit kommen.

Beachte die Safer Use Regeln!! (<https://www.drogenarbeitz6.at/konsum/safer-use.html>)

- Nimm max. die Hälfte einer Tablette und warte mind. 2 Stunden, um die Wirkung zu erfahren.
- Verzichte auf Mischkonsum (auch mit Alkohol, Energydrinks oder Cannabis), da es zu unberechenbaren Wechselwirkungen kommen kann.
- Achte auf die Bedürfnisse deines Körpers: Trink' Wasser & mach' Pausen an der frischen Luft.

Quellen: www.checkyourdrugs.at, www.saferparty.ch