

## Vorsicht: XTC's mit Syntheseverunreinigung

Logo	Philipp Plein
Gewicht	519.8 mg
Grösse	12.8 x 11.3 mm
Dicke	4.2 mm
Bruchrille	Nein
Farbe	Grau
Inhaltsstoffe	<b>MDMA*HCl: 44.0 mg</b> <b>M-alpha-HMCA : ca. 42 mg</b>
Getestet in	Basel (Mobil), 31. Juli 2021



### Risikoeinschätzung

Bei dieser Tablette wurde nebst MDMA zusätzlich **M-alpha-HMCA** nachgewiesen. Bei M-alpha-HMCA handelt es sich nicht um ein Streckmittel, sondern um eine Syntheseverunreinigung. Da kaum Informationen betreffend Wirkung, Risiken, Nebenwirkungen und Langzeitfolgen zu M-alpha-HMCA vorliegen, geht man beim Konsum dieser Tablette ein zusätzliches, unbekanntes Gesundheitsrisiko ein.

**Syntheseverunreinigungen** deuten auf eine unsachgemässe Herstellung hin. Gänzlich unbekannt ist das Wechselwirkungspotential von M-alpha-HMCA mit MDMA.

**Wir raten vom Konsum dieser Tablette ab!**

### Infos zu MDMA\*HCl

Substanz: 3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamin

Dosierung: max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen.

Wirkungseintritt / Wirkdauer: nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

Wirkung: MDMA bewirkt hauptsächlich eine vermehrte Freisetzung des körpereigenen Botenstoffs Serotonin. Diese Ausschüttung löst ein Gefühl der Euphorie, Leichtigkeit und der Unbeschwertheit aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert. Hunger- und Durstgefühl sowie Müdigkeit werden reduziert, die Aufmerksamkeit wird erhöht. Auch die Körpertemperatur und der Blutdruck steigen an.

Nebenwirkungen: Kiefernahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht die Gefahr des Austrocknens oder gar des Hitzeschlags, da die Körpertemperatur ansteigt.

### Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal eine drittel Pille an, da sehr viele hochdosierte Tabletten im Umlauf sind.
- Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Tabletten mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3 dl / Stunde) und mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft, um einer Überhitzung / Dehydration vorzubeugen.
- Akzeptiere, wenn die Wirkung zu Ende geht, denn «Nachspicken» erhöht die Toxizität (Giftigkeit) von MDMA