

Vorsicht: hochdosierte XTC-Tablette mit Syntheseverunreinigung

Name	Delphin
Gewicht	314.6 mg
Durchmesser	8.0 mm
Dicke	5.0 mm
Bruchrille	Nein
Farbe	Beige
Inhaltsstoffe	MDMA*HCl: 144.8 mg 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol: nicht quantifizierbar
Getestet in	Zürich (Mobil), 18. März 2017



Risikoeinschätzung

Über 120 mg MDMA*HCl können zu viel sein. Nebenwirkungen wie „Kiefer mahlen“, Augen- und Nervenzucken, bis hin zu Krampfanfällen können auftreten. Bei Überdosierungen steigt die Körpertemperatur stärker an und es können Halluzinationen auftreten. An Folgetagen, nach der Einnahme solch hoher Dosen MDMA, treten vermehrt Depressionen, Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen und Appetitlosigkeit auf. Die regelmässige Einnahme grosser Mengen MDMA ist neurotoxisch und vergrössert die Wahrscheinlichkeit irreparabler Hirnschäden. Diese Tablette enthält neben MDMA zusätzlich das Synthesenebenprodukt **3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol**. Zu Wirkung, Risiken und Nebenwirkungen von 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol ist nichts bekannt, dasselbe gilt auch für die Kombination von 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol mit MDMA.

Infos zu 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol

Bei 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol handelt es sich um ein Syntheseneben- oder um eine Syntheseausgangssubstanz. Das Vorhandensein dieses Produktes deutet auf eine unsorgfältige Produktion hin.

Infos zu MDMA*HCl

Substanz: 3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamin

Dosierung: max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen. **Wirkungseintritt und –Dauer:** nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

Wirkung: MDMA bewirkt hauptsächlich eine vermehrte Freisetzung des körpereigenen Botenstoffs Serotonin. Diese Ausschüttung löst ein Gefühl der Euphorie, Leichtigkeit und der Unbeschwertheit aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert. Hunger- und Durstgefühl sowie Müdigkeit werden reduziert, die Aufmerksamkeit wird erhöht. Auch die Körpertemperatur und der Blutdruck steigen an.

Nebenwirkungen: Kiefernahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht die Gefahr des Austrocknens oder gar des Hitzeschlags, da die Körpertemperatur ansteigt.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe oder ein drittel Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.