


Vorsicht: Amphetamin verkauft als 2C-B

Getestet in Zürich (DIZ), 01. Dezember 2020



Dieses Pulver enthält kein 2C-B, sondern **Amphetamin und Koffein**. Gerade für unerfahrene Personen, aber auch für medizinisch vorbelastete Personen (Herz, Blutdruck, Personen die Medikamente einnehmen etc...) kann die Einnahme eines falschdeklarierten Pulvers ein erhöhtes Gesundheitsrisiko, aufgrund der unerwarteten Wirkung, darstellen. Zudem könnten sich die Konsumierenden überdosieren, da sich nicht wie erwartet eine psychedelische Wirkung entfaltet und anschliessend rasch nachgelegt werden könnte. Aufgrund der Falschdeklaration und dem damit verbundenen unerwarteten Wirkspektrum, könnte der Trip eine nervöse Komponente beinhalten, welche dem/der UserIn unangenehm einfahren könnten.

Weiter stellt die gleichzeitige Einnahme von mehreren pharmakologisch wirksamen Substanzen aufgrund möglicher Wechselwirkungen ein zusätzliches Gesundheitsrisiko dar, da die Kombination von Amphetamin und Koffein zu einer erhöhten Belastung für das Herz-Kreislauf-System führt. Zudem besteht eine leicht erhöhte Gefahr der Dehydratation, da Coffein dem Körper Flüssigkeit entzieht.

Bei Pulvern und kristallinen Proben kommt es immer wieder zu Falschdeklarationen und Verunreinigungen; auch diese deshalb unbedingt vor dem Konsum in einem Drug Checking testen lassen!

Infos zu Amphetamin*HCl

Substanz: Amphetamin-Hydrochlorid

Dosierung: Niedrige Dosis 5–10 mg, mittlere Dosis 10–25 mg, hohe Dosis 25 – 50 mg. Eine Dosis von 50 mg (geschnupft oder geschluckt) verteilt auf eine ganze Nacht resp. mehrere Stunden wird als maximale Dosis beschrieben. Diese beschriebene Maximaldosis ist als relativ zu betrachten; je nachdem sind für Personen mit schlechter Prädisposition (med. Voraussetzung) bereits 25 mg während einem Konsumereignis bedenklich bis gefährlich.

Wirkungseintritt / Wirkdauer: Geschnupft nach 2–10 Minuten, geschluckt nach 30–45 Minuten, gespritzt bereits nach wenigen Sekunden. / Geschnupft und geschluckt 6–12 Stunden, gespritzt 4-6 Stunden.

Wirkung: Die Freisetzung der körpereigenen Botenstoffe Noradrenalin und Dopamin bewirken ein Gefühl erhöhter Leistungsfähigkeit, eine Steigerung des Selbstwertgefühls, Erhöhung der Körpertemperatur, Unterdrückung von Müdigkeit, Hunger und Durst, erhöhte Risikobereitschaft, unterdrücktes Schmerzempfinden, Euphorie und einen gesteigerten Rededrang (Lagerflash).

Nebenwirkungen: Zittern, Unruhe, Übelkeit, Herzrasen und Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Nervosität, Gereiztheit, Appetitlosigkeit und aggressives Verhalten (vor allem in Kombination mit Alkohol, Gefahr einer Alkoholvergiftung). Bei hohen Dosen: Halluzinationen, Kreislaufversagen, Schlaganfälle sowie Nieren-, Leber- und Herzversagen und Zustände tiefer Bewusstlosigkeit. Eine oft unterschätzte Gefahr ist das Ansteigen der Körpertemperatur, welche zu einer Austrocknung des Körpers führen kann.

Weitere Infos zu Nebenwirkungen und Langzeitrisiken findet ihr unter saferparty.ch/speed.

Safer Use Regeln

- Trinke genug nichtalkoholische Getränke (0.25 -0.5 l/Stunde)
- Vermeide Mischkonsum, speziell mit anderen Stimulanzien und Tramadol (Serotoninsyndrom)
- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine kleine Menge an, um Überdosierungen zu vermeiden und warte nach oraler Einnahme 2 Stunden, da immer wieder Pulver / Kristalle mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.
- Verwende bei einer nasalen Applikation (sniffen) von Pulvern immer deine eigenen Sniffutensilien, um dich oder andere nicht mit Krankheiten anzustecken.